

# CUARENTAGRI

## INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA Ilha de S.Miguel – 23/08/2023

**Cultura: Macieira**  
**Praga: Bichado-da-macieira**  
***Cydia pomonella* L.**  
**(Lepidoptera: Tortricidae)**



Figura 1 - Borboleta (adultos) de Bichado-da-macieira.



Figura 2 – Lagarta de Bichado-da-macieira furando o fruto.



Figura 3 – Armadilha Delta de monitorização do Bichado-da-macieira com feromona sexual específica.

**Os adultos (borboletas)** do bichado da macieira (Fig.1) surgem em junho registando-se os seus maiores picos populacionais em julho e agosto.

O ataque nos frutos das lagartas desta praga é facilmente observado através da presença de excrementos à superfície e em volta do orifício feito pela lagarta para penetrar no fruto (Fig. 2).

As principais fruteiras que esta praga afeta são: as macieiras, pereiras, pessegueiro, marmeleiros, dióspiros e nogueira europeia.

A sua monitorização e captura em massa é feita usando armadilhas delta com feromona sexual específica (Fig.3).

### Na última semana de monitorização:

- Não houve capturas de adultos nas Capelas e nas Furnas (Quadro 1; Figura 4 e 5).

## DRAg/DSA - Direção Regional da Agricultura

### Direção de Serviços de Agricultura

Quadro 1- Capturas de adultos de *Cydia pomonella* L. registadas nas Capelas e nas Furnas, na ilha de S. Miguel, no ano de 2023.

Data de recolha	Capelas	Furnas
29/06/2023	0	0
05/07/2023	0	0
13/07/2023	0	0
20/07/2023	0	0
27/07/2023	0	0
3/08/2023	0	0
10/8/2023	0	0
17/8/2023	0	0




Figura 4 - Capturas de adultos de *Cydia pomonella* L. registadas nas Capelas, na ilha de S. Miguel, no ano de 2023.




Figura 5 - Capturas de adultos de *Cydia pomonella* L. registadas nas Furnas, na ilha de S. Miguel, no ano de 2023.