



Figura 1 - Adulto e larva de gorgulho, estragos no pseudocaule e armadilha monitorização.



Figura 2 - Parcela de bananeiras

Praga: Gorgulho da bananeira

O gorgulho da bananeira (Fig. 1) é uma praga-chave da bananeira nos Açores.


A **estimativa do risco** das populações e avaliação do impacto da sua ação alimentar realiza-se através do corte do pseudocaule das plantas mãe através da observação das galerias causadas pelas suas larvas esbranquiçadas aí presentes (Fig.1).

As estratégias de luta a implementar no seu combate passam pelo uso de armadilhas (Fig.1) com feromonas de agregação onde a combinação da armadilha Cosmotrack com o atrativo Cosmoplus se tem mostrado a mais eficaz (Fig.1).


Cultura: Bananeira

As bananeiras (Fig.2) cultivadas são da variedade Cavendish anã, grupo Musa AAA e do subgrupo Cavendish, tipo anã. É uma planta muito exigente em temperatura (o crescimento cessa a temperaturas inferiores a 10 °C e superiores a 38 °C) e em água e é muito sensível aos ventos fortes. Prefere solos férteis, com boa drenagem, não salinos e com pH entre 5,8 e 6,5.

Gráfico 1 - Evolução das capturas de Gorgulho da bananeira no local Quinta Amaro, na freguesia São Pedro (Angra do Heroísmo), no ano 2023.



ATENÇÃO: FOI DETETADO UM AUMENTO DE CAPTURAS DE ADULTOS NA PARCELA DE SÃO PEDRO NA ARMADIÇA STOPWEEVIL NOS ÚLTIMOS 15 DIAS (28 PARA 57 ADULTOS NO TOTAL DE CAPTURAS)



Veja aqui os produtos que pode utilizar para praga "Gorgulho da bananeira" na cultura "Bananeira"

Quadro 1 - Capturas de Gorgulho da bananeira no local Quinta Amaro, na freguesia São Pedro (Angra do Heroísmo), no ano 2023.

Data	007BANGORSTWSOR + Stopweevil	008BANGORSTWSOR + Stopweevil	009BANGORSTWSOR + Stopweevil
2023-04-12	4	8	16
2023-04-26	20	18	18