



Figura 1 - Adulto e larva de gorgulho, estragos no pseudocaule e armadilha monitorização.



Figura 2 - Parcela de bananeiras

Praga: Gorgulho da bananeira

O gorgulho da bananeira (Fig. 1) é uma praga-chave da bananeira nos Açores.


A **estimativa do risco** das populações e avaliação do impacto da sua ação alimentar realiza-se através do corte do pseudocaule das plantas mãe através da observação das galerias causadas pelas suas larvas esbranquiçadas aí presentes (Fig.1).

As estratégias de luta a implementar no seu combate passam pelo uso de armadilhas (Fig.1) com feromonas de agregação onde a combinação da armadilha Cosmotrack com o atrativo Cosmoplus se tem mostrado a mais eficaz (Fig.1).


Cultura: Bananeira

As bananeiras (Fig.2) cultivadas são da variedade Cavendish anã, grupo Musa AAA e do subgrupo Cavendish, tipo anã. É uma planta muito exigente em temperatura (o crescimento cessa a temperaturas inferiores a 10 °C e superiores a 38 °C) e em água e é muito sensível aos ventos fortes. Prefere solos férteis, com boa drenagem, não salinos e com pH entre 5,8 e 6,5.

Gráfico 1 - Evolução das capturas de Gorgulho da bananeira no local S.Bento (Império), na freguesia São Bento (Angra do Heroísmo), no ano 2023.



SENHORA PRODUTORA: Na última semana de monitorização registou-se um ligeiro aumento das capturas de adultos na armadilha STOPWEEVIL com atrativo SORDIDINA 90K (DE 4 PARA 7 ADULTOS NO TOTAL DAS 3 ARMADILHAS)



Veja aqui os produtos que pode utilizar para praga "Gorgulho da bananeira" na cultura "Bananeira"

Quadro 1 - Capturas de Gorgulho da bananeira no local S.Bento (Império), na freguesia São Bento (Angra do Heroísmo), no ano 2023.

Data	010BANGORSTWSOR + Stopweevil	011BANGORSTWSOR + Stopweevil	012BANGORSTWSOR + Stopweevil
2023-04-12	2	0	2
2023-04-26	2	1	4