

CUARENTAGRI

INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA Ilha Terceira – 14/06/2023

Cultura: Macieira
Praga: Bichado-da-macieira
***Cydia pomonella* L.**
(Lepidoptera: Tortricidae)



Figura 1 - Borboleta (adultos) de Bichado-da-macieira.



Figura 2 – Lagarta de Bichado-da-macieira furando o fruto.



Figura 3 –Armadilha Delta de monitorização do Bichado-da-macieira com feromona sexual específica.

Os adultos (borboletas) do bichado da macieira (Fig.1) surgem em junho registando-se os seus maiores picos populacionais em julho e agosto.

O ataque nos frutos das lagartas desta praga é facilmente observado através da presença de excrementos à superfície e em volta do orifício feito pela lagarta para penetrar no fruto (Fig. 2).

As principais fruteiras que esta praga afeta são: as macieiras, pereiras, pessegueiro, marmeleiros, dióspiros e noqueira europeia.

A sua monitorização e captura em massa é feita usando armadilhas delta com feromona sexual específica (Fig.3).

Na última semana de monitorização:

Nesta semana de monitorização não se registou capturas de adultos (Fig.1 e 2; Quadro 1). Uma armadilha Delta com feromona sexual específica foi utilizada para a monitorização desta praga nos Biscoitos e na Vinha Brava.

SDAT - Serviços de Desenvolvimento Agrário da Terceira




Figura 1 e 2- Evolução das capturas de adultos de *C. pomonella*, nas parcelas de macieiras, nas freguesias dos Biscoitos e da Vinha Brava, no ano 2023.

Quadro 1 - Capturas de adultos de *C. pomonella* registadas nas parcelas de macieira monitorizadas, nas freguesias dos Biscoitos e da Vinha Brava, no ano 2023.

Macieira - Biscoitos			
Dias da leitura	Biscoitos		Vinha Brava
	Colocação da armadilha	Media armadilha dia	Colocação da armadilha
12/4			
24/4	0	0	0
18/5	0	0	0
1/6	0	0	0
13/6	0	0	0