

CUARENTAGRI

INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA Ilha Terceira – 22/09/2023

Cultura: Batateira

**Praga: Traça comum da batata
Phthorimaea operculella Zeller
(Lepidoptera: Gelechiidae)**



Figura 1- Lagarta de *Phthorimaea operculella*.



Figura 2- Adulto de *Phthorimaea operculella*.



Figura 3- Estragos causados pelas lagartas de *Phthorimaea operculella*.



Figura 4 - Armadilha Delta com placa de cola e feromona sexual (no centro).

O adulto da traça da batata (*Phthorimaea operculella* Zeller) é uma pequena borboleta pertencente às traças da batateira (Fig. 2). É uma praga importante principalmente da batata armazenada.

A lagarta (Fig. 1) têm coloração esbranquiçada no início do seu desenvolvimento, que evolui para uma cor enegrecida e provoca galerias em folhas, perfura os novos rebentos da parte aérea e penetra depois nas batatas no campo e nas armazenadas fazendo galerias superficiais e profundas nestas (Fig.3). É fácil observar os seus estragos no exterior das batatas, junto aos orifícios da sua entrada (Fig. 3).

As lagartas (Fig.1) podem pupar no solo, em caixas, sacos, nos cantos dos armazéns e, por vezes, no interior dos tubérculos. Esta praga pode atacar outras culturas para além da batateira como o tomateiro, tabaco, pimento, beterraba e beringela.

A sua **estimativa do risco e monitorização** realiza-se utilizando armadilhas Delta com feromona sexual específica (Fig.4)

Na última semana de monitorização:

- Não houve capturas de adultos no **armazém da Fruter** (Fig 5; Quadro 1).
- Na **Ribeirinha e na Casa da Ribeira registou-se um aumento das capturas** (Fig.6 e 7; Quadros 2 e 3)

FRUTER




Figura 5 –Capturas de adultos de *P. operculella* no armazém da FRUTER.

Quadro 1 –Capturas de adultos de *P. operculella* no armazém da FRUTER.

<i>Phthorimaea operculella</i>		
FRUTER		
Dias da leitura	Total	Média armadilha dia
23/5	0	0
7/6	0	0
21/6	0	0
7/7	0	0
18/7	0	0
4/8	0	0
16/8	0	0
30/8	0	0

Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira (SDAT)




Figura 6 –Capturas de adultos de *P. operculella* na Ribeirinha e Casa da Ribeira.

Quadro 2 – Capturas de adultos de *P. operculella* na Ribeirinha e Casa da Ribeira.

<i>Phthorimaea operculella</i>				
Ribeirinha		Casa da Ribeira		
Dias da leitura	Total	Média armadilha dia	Total	Média armadilha dia
18/5	0	0	0	0
1/6	0	0	0	0
13/6	1	0,08	0	0
27/6	1	0,07	0	0
10/7	0	0	0	0
27/7	2	0,12	1	0,05
23/8	7	0,25	3	0,11
6/9	4	0,29	4	0,29
21/9	5	0,33	5	0,33